



SOUTH CAROLINA
CANCER ALLIANCE

SABÍA QUE...

**LA PRUEBA DE CÁNCER COLORRECTAL
AYUDA A DETECTAR EL CÁNCER
TEMPRANO, CUANDO ES MÁS TRATABLE.**

Hable con su proveedor de atención médica sobre cuándo comenzar a hacer la prueba del cáncer colorrectal, qué prueba(s) debe hacerse, las ventajas y desventajas de cada prueba.

VISITE SCCANCER.ORG/COLON PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



PRUEBA DE CÁNCER COLORRECTAL

Aproximadamente **2,166*** personas son diagnosticadas con cáncer colorrectal y **829** mueren a causa de la enfermedad cada año.

El cáncer colorrectal es uno de los cánceres diagnosticados con mayor frecuencia tanto en hombres como en mujeres, y aunque es uno de los cánceres principales más mortales, también es el más prevenible. El cáncer colorrectal comienza en el colon o el recto y, a menudo, se observa como un crecimiento llamado pólipo. Los pólipos se convierten en cáncer con el tiempo, y encontrar y extirpar los pólipos puede prevenir el cáncer colorrectal por completo.

Esta estadística **excluye los cánceres in situ.*

Se recomienda la prueba de detección del cáncer colorrectal para adultos que tienen entre **50 y 75 años**.

La decisión de realizar una prueba de detección del cáncer colorrectal en adultos de **76 a 85 años** debe ser individual y con el proveedor, teniendo en cuenta la salud general del/de la paciente y su historial de detección previa.

Fuente: Las recomendaciones de detección en esta hoja informativa fueron adaptadas del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre la detección del cáncer colorrectal y los diferentes tipos de pruebas, visite www.sccancer.org/colon o llame al **803-708-4732**.